

ਆਪੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ



ਅਸ ਅਸ ਕਬੂਲ
9915291533

ਆਚਲਾਈਏ

ਤੰਬਾਕ ਮਕਤਸਮਾਜ

ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਿਵਰਗਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨ 1608 ਈ. ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸ਼ਮੀਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲਗ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਣ ਅਨੇਕ ਹੁਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੀਡੀ, ਸਿਗਰਾਟ, ਗੁਰਖਾ, ਜ਼ਰਦਾ, ਥੈਨੀ, ਹੁੱਕਾ, ਸਿਲਮਾਂ ਆਦਿ। ਤੰਬਾਕੂ ਇੱਕ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਹੜ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਰੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਗਰ ਨਾਲੋਂ ਥੀਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 48 ਫੀਸ਼ਮੀਟੀ ਮਰਦ ਅਤੇ 20 ਫੀਸ਼ਮੀਟੀ ਔਰਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਡਿੰਡ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਸਾਇਣ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਈਏਆਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਈ ਕੈਂਸਰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗਸਾਇਣਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਨੂੰ ਕਰਸੀਨੋਨ (ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੀਲਾ ਗਸਾਇਣ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਣ ਕਾਰਨ ਗਲੇ-ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਦਮਾ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅੰਨ੍ਹਾ/ਬੋਲਾਪਣ, ਫੇਵਕਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਪੇਟ ਦੇ ਅਲਸਰ, ਐਸੀਡਿਟੀ ਅਤੇ ਦੰਦ ਮਸੂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੁਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸ਼ਮੀਟੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸ਼ਮੀਟੀ ਮੁੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ 80 ਫੀਸ਼ਮੀਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.2 ਲੱਖ ਸੀ। ਐਨਐਸਐਸਓ. ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 5500 ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਣ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੌਕੀਆ ਸੇਵਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸੌਕ ਲਤ ਜਾਂ ਆਦਤ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ

ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਚਿੱਤਰ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦਸ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੌਤ ਸਿਗਰਟਾਨੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਾਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਕੀਨ ਥੈਂਡ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪੁੰਧੇਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਾਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪੁੰਧੇਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਸਮੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸਮੇਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਿਵ ਸਮੇਕਿੰਗ ਸਦਕਾ ਵੀ ਫੇਵਰਿਊਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਹੈਂਡ ਦਾ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸ਼ਦੀ ਖੇਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ 31 ਮਈ ਨੂੰ
ਹੈ।

ਲੁ ਲੱਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਲਿਟਾ
ਦਿਓ। ਠੰਡੇ, ਗਿੱਲੇ ਕੱਥੜੇ
ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਗੋਰ ਧੰਡੇ ਜਾਂ
ਫਿਰ ਠੰਢੇ ਧਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ।



ਲੁਣਗਲਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਚਾਅ

ਕੌ ਚਾ ਪਿਆਜ਼, ਥੇਲ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣ ਨਾਲ
 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਮਈ ਅਤੇ ਮੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਮੀ
 ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੌਰਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਰੇ ਦੇ
 ਨਾਲ ਅੱਗ ਉਗਾਲਦੇ ਸੂਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ
 ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜੁੰ ਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਲੂ
 ਲੋਗਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ
 ਭੁਲ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
 ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੁਲਦੀਆਂ
 ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੂ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੁਲ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ
 ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭੁਲ ਲੋਕ ਇਹ ਗਰਮੀ
 ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ

- ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੋਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਾਂ ਕਰਨ ਵੇਖਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੁਝ ਉਪਾਂ ਏਸਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਏ, ਇਹ ਉਪਾਂ ਅਪਣਾ ਰੱਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਿਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ :

 - ਲੂ ਲੰਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਲਿਟਾ ਦਿਓ। ਠੰਡੇ, ਰਿੱਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰੀ਷਼ਟ ਨਾ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਸਾਧਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਓ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਮੂਲ ਪਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਓ।
 - ਪੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਨਾ, ਟੌਪੀ ਜਾਂ ਛੁਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਲ ਰੱਖੋ।
 - ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 - ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲਕੇ ਅਤੇ ਛਾਣਕੇ ਬੇਚੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਰੱਖੋ। ਪੀਣ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਲੂ ਤੋਂ ਰਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
 - ਮੇਥੀ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੋ।

- ਇਸਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪੀਂਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲ ਕੇ ਕੱਪੜੇ

- ਲੁਂ ਤੋਂ ਬਚਰਣ ਲਈ ਦੁਪਰਿਹ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਹੁੰਗੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਤੌਲੀਏ ਜਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਤ੍ਰਿਹੁਣੀ ਢਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਦੇਵੇਂ ਕੰਨ ਵੀ ਢਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਹਨ।
 - ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਟਿੰਡਾ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਲਲਟੀ ਜਸ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ।
 - ਲੁਂ ਤੋਂ ਬਚਰਣ ਲਈ ਬੇਲੀ ਜਾਂ ਨਿੜ੍ਹੁ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰੇਵੇਂ ਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 - ਲੁਂ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਗਾਊਂਕੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੌਦੇ ਹਾਲਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਗਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

• ਡਾ. ਅਤੁਲ ਦੱਤਾ

ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਰੱਖੋ ਭਾਸ ਖਿਆਲ



ਲੀਵਰ ਟੈਸਟ ਡੰਕਸ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਾਬਦ
 ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਠੀਕੀ ਰੋਗ ਦੀ ਵਾਖੀ
 ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਦੀ
 ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਰ
 ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਾਓ। ਇਹ ਟੈਸਟ
 ਲਿਵਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲੀਨ ਬਾਬੇ ਟੈਸਟਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਲਈ
 ਅਸਟਰਾਕਾਰਿਕ ਵੀ ਹੈ।

ਜਿਆਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾ
 ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ
 ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫੈਟੀ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
 ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਆਦਾ ਫੈਟ ਨਾਲ
 ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਸੋਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
 ਮਿਹਦਾ ਵੀ ਸੁੰਗੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ
 ਸੁਰੂਆਤੀ ਟੌਰ 'ਚ ਇਸਦਾ ਧਤਾ
 ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ
 ਸੰਭਵ ਹੈ ।

- **ਜਿਆਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾ**
 ਖਾਣਾ ਥਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ
 ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫੈਟੀ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
 ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। **ਜਿਆਦਾ ਫੈਟ ਨਾਲ**
 ਮਿਹਦੇ'ਚ ਸੋਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
 ਮਿਹਦਾ ਵੀ ਸੰਗੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ
 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸਦਾ ਪਤਾ
 ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ
 ਸਿਭਵ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ
 ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ।
 ਵਾਹਿਗੁਰ ਹੈਪੈਟਾਈਟਿਸ ਏ., ਥੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਈ ਹੈਂ
 ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਲਿਵਰ ਖਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏ ਅਤੇ ਈ ਦੀ
 ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ
 ਆਮ ਤਥਾਂ 'ਚ ਪੀਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ
 ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਹਵਿਤਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ
 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲ੍ਲਈ ਅਤੇ ਬੁਖਰ ਆਉਣਾ ਹੈ।
 • ਥੀ ਅਤੇ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
 ਦੇ ਢੁੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ
 ਲਗਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੱਛਣ ਚਾਰ ਮਰੀਜ਼
 ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

• ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ
 ਕੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਪੈਟਾਈਟਿਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ
 ਹੈ। ਏਨੋ ਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰ ਲਿਵਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਾਂ
 ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਮੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁੱਕ
 ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਪੀਲੀਆਂ ਆਦਿ
 ਹੋਣਾ ਹੈ।

• ਸਰਬ ਦੇ **ਜਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਲਿਵਰ**
 ਖਰਥ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਰ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ
 (ਡਾਈਬ੍ਰੈਂਸ) ਬਲਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ
 ਮਿਹਦਾ ਸੰਗੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਦੇ'ਚ ਫੋਟੀਆਂ
 ਵੰਡੀਆਂ ਗੀਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿ ਲਿਵਰ ਮਿਰੋਮੈਂਟ
 ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ।

• **ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੋ ਸੈਲ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ**
 ਹਨ ਤਾਂ ਮਿਹਦਾ ਖਰਥ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ
 ਬੈਂਕੀਟੀਨੀਆ ਵੀ ਫੈਟੀ ਮਿਹਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ
 ਇਹ ਪਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਖਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਾਵੀ ਦੇਰ ਥਾਵਾਂ
 ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 30-40 ਕੀਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਿਵਰ ਦੇ
 ਸੈਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ
 ਅਲਕੋਹਿਲਕ ਡੀਸੀਜ਼ ਥਾਵੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

• ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬਚਾਅ ਹੀ ਭਲ
 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਤਮੰਦ ਮਿਹਦੇ ਲਈ ਜੀਵਿਨਸ਼ੈਲੋਜ਼
 ਅਤੇ ਬਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 • ਦੂਸ਼ਿਤ ਖਾਣਾ, ਸਰਬ ਅਤੇ ਮਿਹਾਟਨਨੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੋਗ
 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੰਟ ਨੀਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦ


ਮਿਥੁਨੇ ਜੀ ਲੇਖਕ

- ਇਹ ਦਾ ਵਡਲ
ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬਚਾਅ ਹੀ ਭਲ
ਥਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਿਰਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ
ਪਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਾਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।

6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪੱਧਰ ਠੀਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦ

ਬੇਹੁੰਦ ਕਾਰਗਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਲਾਲੀ ਰੇ ਇਲੈਕਟੋ-ਹੋਮਿਓਥੈਲੀ



ਦੁਜੀਆਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨੂੰ
ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਕੀ ਬਹੁਤ
ਠੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ-
ਗੇਮਿਚਪੈਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਰੋਗ
ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਿਧੀ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਲੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ, ਪਾਲੀ ਤੇ ਧਰਤੀ
 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ
 ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀ ਬੇਹੁਦ ਗੰਧਲਾ ਆਤੇ ਜੁਹਿਗੀਲਾ ਬਲਾ
 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੁੱਲੋਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰ ਹੈ

